

Listado de Esteroides

[A](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [H](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [S](#) [T](#) [W](#)

A

ADIPOSINUM: Se trata de un extracto de la glandula pituitaria anterior de los terneros.Su funcion es quemar la grasa y acelerar el metabolismo.Las dosis promedio son de 50 a 100 unidades dos veces al dia durante 3 semanas tratando de ingerir pocos hidratos.Problemas secundarios de esta droga son la retencion de agua o incluso alguna alergia.

ALDACTONE: Es un diurético y pertenece al subgrupo de la diurética potasio-potassium-sparing. Aldactone es un antagonista de la aldosterona. La aldosterona, acelera la excreción del potasio y reduce la excreción del sodio y del agua simplificados, aldosterona regula la casa endógena del agua. Cuanto más alto es el nivel de la aldosterona, más agua se guarda en el cuerpo. El uso de Aldactone da lugar a una reducción significativa en el nivel de la aldosterona de modo que ocurra una excreción creciente del sodio y del agua mientras que, en el mismo tiempo, se reabsorba el potasio. Esto también explica porqué se llama al Aldactone un diuretico ahorrador de potasio-potassium-sparing diurético puesto que no causa una pérdida de potasio como thiazides y furosemides.

Los atletas deben observar terminantemente que durante el uso de Aldactone no se toma ningún potasio adicional puesto que éste causaría un aumento peligroso para la vida. En el potasio del suero la diurética lotassiumsparing llana tiene efectos diuréticos relativamente bajos para poder llamar Aldactone un diurético suave. Es interesante observar que Aldactone es también un antiandrogeno puesto que reduce el nivel del andrógeno. Los atletas femeninos se aprovechan de esta característica usándola al minuto mize los síntomas del virilization durante el tratamiento esteroide

<http://www.factorestetica.com>

o los síntomas después del tratamiento. Para este propósito Aldactone se toma normalmente diariamente por 10 a 14 días, usándolo en una dosis de 50 mg/día. En hombres que esto podría causar problemas puesto que el lazo del nivel del andrógeno al nivel del estrógeno cambia en el favor del último así, los efectos secundarios comunes en hombres incluya el dolor en la hinchazón de las enterreroscas y del pecho (gynecomastia).

El uso de Aldactone por Bodybuilders es casi exclusivamente durante la semana antes de una competición. Puesto que esto no causa un efecto de drenaje dramático, se toma generalmente 5-6 días en una dosificación de 2 tablillas de diario del magnesio 50. Aldactone no se debe utilizar expediently para drenar el agua a última hora. Los atletas masculinos y femeninos lo toman. Los efectos secundarios de los diuréticos ahorradores de potasio son relativamente bajos comparados a los de las thiazides y a los furosemides. Los problemas principales en hombres consisten en gynecomastia y posible impotencia . Otros efectos secundarios pueden ser tensión arterial baja, espasmos del músculo, vértigos, dolor gastrointestinal, vomitando, pulso irregular, y fatiga. Es importante observar que hay un, aumento significativo en el nivel del potasio del suero (véase arriba).

Aldactone es una droga de la prescripción disponible en farmacias americanas. Aldactone de Hoehringler que Mannheim de Alemania se encuentra a menudo en sea mercado negro. Una caja contiene 50 grageas de 50 mg y cuesta aproximadamente. \$30 en el mercado negro. El Aldactone mejicano de Searle se puede también encontrar con frecuencia en el mercado negro. Las 25 tablillas del magnesio están de color marrón claro; mellado, y tenga una impresión de SEARLE. El conjunto original contiene tres tiras, cada uno con 10 tablillas. No hay actualmente falsificaciones de Aldactone disponibles.

ANABOLICUM VISPHER: Es un esteroide oral producido solamente en Italia. Se administra en una forma inusual puesto que se toma como cápsulas o en gotas. El último tipo de administración no es utilizado por los atletas. En medicina el vister se utiliza sobre todo para tratar a los ancianos, en mujeres determinadas después de la menopausia, y para el tratamiento de enfermedades y de síntomas generales de la

tercera edad. Esto es debido al hecho de que el vister de Anabolicum es un esteroide androgénico muy débil que se tolera bien. Tiene principalmente un efecto anabólico que estimule la síntesis de la proteína y tiene la característica agradable de que no aromatiza. También causa solamente una retención baja del agua y de la sal. Además, la sustancia no es 17-alpha que alcaliza y por lo tanto, no es tóxica para el hígado. Sin embargo, todas estas características hacen de vister un esteroide muy débil que no ayuda a los atletas a alcanzar mejoras significativas. Las mujeres, los viejos atletas, y los principiantes pueden ganar algunas ventajas mientras que el más avanzado será decepcionado por su efecto. Los hombres necesitan generalmente dosis muy altas en el rango de 80-120 mg/día para sentir cualquier cosa, mientras que algunas mujeres reaccionan con un aumento pequeño del músculo y un aumento agradable de la fuerza tomando solamente 30-40 mg/día. Como efectos secundarios anteriores mencionados de él son mínimos y ocurren generalmente en personas al tomar altas dosis y mostrar una sensibilidad al efecto residual androgénico. Trae treinta cápsulas que vienen en una botella de cristal con un casquillo del tornillo, empaquetado en un rectángulo que corresponde con. El vister de Anabolicum se encuentra raramente en el mercado negro puesto que hay muy pocas peticiones de atletas.

ANADROL: Anadrol era la marca de los E.E.U.U. para las tabletas de 50mg Oxymetholone, que estaban disponibles en los E.E.U.U. hasta 1993. Syntex es el productor mundial de esta droga. Oxymetholone es un esteroide oral alkylated 17alpha.. Anadrol producirá aumentos extremadamente dramáticos de peso y fuerza en su utilización. Algo de este aumento de peso y de la fuerza será debido a la retención del agua pesada de las drogas. Los utilizadores de Anadrol señalan caídas severas al parar el uso, sobre todo debido a la pérdida de agua y a la producción endógena inhibida de la hormona causada durante el ciclo. Aparte del agua, Anadrol hace subir la fuerza como ningún otro esteroide. Un ciclo corto de Anadrol podía explicar un aumento de 20lbs de fuerza en muchos utilizadores, a veces más. Es un esteroide que tiene muchos efectos secundarios, Anadrol no debe ser nunca utilizado por las mujeres. Para los levantadores, el oxymetholone se convertirá fácilmente en estrógeno y a DHT. Debido además a la retención de agua se suele producir un aumento en la presión arterial. Las funciones del riñón pueden también

sufrir durante un uso muy largo. La pérdida del pelo también ha estado señalada entre utilizadores con un predisposición para la calvicie del varón-modelo. El atributo más peligroso de Anadrol es que sea 17alpha alkylated. Como usted sabe probablemente los orales 17alpha alkylated son tóxicos para el hígado. Semejante al Dianabol (otro 17aa popular oral) es eficaz en dosis de 15mg, los usuarios de Anadrol comienzan generalmente con 50mg/day y condujeron a menudo a 150mg/day. Cuando se toman 3 tablillas de Anadrol. Su hígado está procesando el equivalente de 30 tablillas de Dianabol. Durante su uso es conveniente mirar los niveles hepáticos cada cierto tiempo. Cuando usted oye hablar de las historias del horror que implican el cáncer del hígado del uso de esteroides, Anadrol es posiblemente el culpable. Para el tratamiento médico, Syntex recomienda 1-5mg/kg del peso del cuerpo por día. Esto conduce a muchos pacientes a tomar tanto como tabulaciones 8+ por día, por períodos largo de tiempo. Ésto es mucho más de lo que un atleta necesitaría y debe utilizar, a esto se debe que los casos documentados de cáncer del hígado son más prominentes entre los no-atletas que toman Anadrol médicamente. Últimamente, mucha gente está especulando encendido cuánto tiempo este producto estará disponible. Syntex ha parado la producción de Anadrol en los E.E.U.U., Oxitosona en España y el uso médico en otras áreas del mundo se suele declinar debido al advenimiento de drogas más nuevas y seguras.

Aparte de la versión mejicana, el resto de las formas de Anadrol ahora se están falsificando, a menudo con exactitud increíble. En los E.E.U.U., se vende una versión del Anadrol americano ahora inasequible falsificado en el cual el rectángulo, la botella e incluso el estampar de la tablilla son idénticos a la versión verdadera. La única diferencia considerada es la carencia del ingrediente activo. Puesto que los E.E.U.U. verdaderos Anadrol han estado fuera de producción por una cierta hora, sería seguro decir que cualquier Anadrol etiquetado es falso. Anapolon se copia también con buena exactitud. Oxitosona puesto que Syntex dejó su producción en 1993, se debe considerar falso. Hemogenin del Brasil es otra versión popular que también se falsifica. Actualmente, todo el Anadrol rojo flojo de Méjico (estampado con SYNTEX en una cara y 2902 en la otra) que están circulando se debe considerar verdadero. Está disponibles solamente para las clínicas y los hospitales en Méjico, así que las fuentes de mercado negro son limitadas.

<http://www.factorestetica.com>

ANADOR:

Sustancia: hexyloxyphenypropionate del nandrolone

Nombres comerciales

Anador 50 mg/ml; Pharmacia Franco, Anadur 50 mg/ml; Kabi Pharmacia G, A, CH, o; Pharmacia B, NI, La Florida, Cz Anadur 50 mg/2m1; Eczacibasi Tk Anadur 25 mg/ml; Lundbeck Dk Anadur 25 mg/ml; Lundbeck Dk Anadur (o.c.)25 mg/ml; Leo Es Anadurin 50 mg/ml; Xponei Gr.

Anadur es uno de muchos esteroides que contiene el nandrolone compuesto. Aunque está disponible en muchos atletas y en muchos países no se utiliza a menudo. Puesto que su efecto es similar a Deca-Durabolin la mayoría de la gente no ve ninguna razón de tomar Anadur. Este producto , no obstante tiene algunas características que lo hacen diferente al " Deca " y por lo tanto es una droga interesante. Anadur es la nandrolona duradera más larga. Después de solamente una inyección la sustancia sigue siendo activa en el cuerpo por cuatro semanas. Anadur, sobre todo, tiene un efecto anabólico que estimula la síntesis de la proteína y, como con todas las nandrolonas, requiere un alto consumo de la proteína. Aunque todo el mundo sabe que durante el uso de esteroides es más necesario el consumo de proteína, el efecto del nandrolone depende de este requisito más que cualquier otro esteroide. Aunque esto es generalmente infrecuente con los productos esteroides, la información del consumidor sobre Anadur precisa este hecho: " durante el tratamiento de Anadur se debe tomar una dieta completamente equilibrada con la proteína adecuada. " En la práctica, se ha mostrado que requiere una cantidad mínima diaria de 1 - 1,5 mg/peso . Anadur no es un esteroide con el que se alcanzan aumentos rápidos en peso y fuerza sino es un esteroide anabólico clásico, básico que se puede salvar en el cuerpo, permitiendo un aumento lento pero sólido del músculo y un aumento uniforme de la fuerza. Los atletas que usan Anadur señalan menos retención del agua que con Deca. Por esta razón algunos bodybuilders prefieren Anadur al prepararse para una competición. Debe ser observado, sin embargo, que en esta fase el uso de Anadur se debe combinar con esteroides androgénicos más fuertes tales como propionate de Parabolan o de la testosterona, puesto que el efecto androgénico de Anadur es demasiado bajo

proteger contra la pérdida de músculo contra overtraining durante una dieta. Debido a su lento, efecto uniforme, y compatible se utiliza sobre todo durante los tratamientos esteroides que duran por varios meses. Para la mayor parte, sigue habiendo el progreso hecho durante este período generalmente después de continuar el producto. Anadur es también un compuesto conveniente para los principiante esteroides y los atletas femeninos. Al tomar 50-100 mg cada 10 días las mujeres no muestran normalmente ningunos síntomas y de virilization tienen gusto de combinar Anadur con las tablillas de Winstrol, Primobolan 5-tabletas, u Oxandrolone. Los hombres no tienen que tomar antiestrogenicos puesto que Anadur aromatiza solamente ligeramente y solamente en casos raros conduce al ginecomastia.

Los efectos secundarios de Anadur son incluso menos que los de Deca-Durabolin. El daño del hígado se excluye puede incluso tomarlo gente con enfermedades del hígado. Los síntomas de Virilization tales como acné, hoarseness, voz profunda, hirsutismo, y aumento en libido ocurren solamente, en mujeres muy sensibles. Una tensión arterial más alta, debido a una retención baja del agua y de la sal, no se pueden excluir pero ocurren raramente. El uso de testosterona-testosterone-stimulating compuestos tales como HCG o Clomid no es necesario puesto que Anadur influencia el eje testicular hypothalamohypophysial solamente levemente para no reducir la producción endógena de la testosterona perceptiblemente y el riesgo de una inhibición spermatogenic sea mínimo. Anadur es un esteroide muy compatible que mejora la condición general y bienestar de su utilizador. Algunos atletas mencionan un bienestar psicológico mejorado. En cuanto a la dosificación, los buenos resultados se pueden obtener con 200mg cada 10 días. El contrario a Deca, que los atletas generalmente lo inyectan cada semana, Anadur produce efectos extremadamente largos, permitiendo intervalos grandes entre las inyecciones. Los atletas que no están asustados de inyecciones más grandes utilizan una inyección grande de 4 ml cada 10 días. El precio alto elevado de Anadur puede realmente asustar al atleta. En el mercado negro de los E.E.U.U., un ampolla grande cuesta aproximadamente. \$13 a \$15. Un producto farmacéutico de los E.E.U.U. no existe. El Anadur belga y turco, el Anador francés, y la versión griega

Anadurin cuesta aproximadamente. \$10-i5 por 50mg/ampolla en el mercado negro.

ANAPOLON: Anapolon ha sido uno de los esteroides orales más fuertes, es un derivado de la dihydrotestosterone que actualmente sólo ha estado disponible para el uso institucional en México. Clínicamente, Anapolon había sido a menudo prescrita en los esfuerzos de tratar anemias que se habían causado por la producción de la célula roja deficiente. Las propiedades androgénicas son altas . Muchos atletas que lo han tomado dicen de el que la fuerza y los aumentos de peso habían sido muy sustanciales dentro de un periodo relativamente corto de tiempo. Esta característica había permitido el compuesto de Anapolon haber sido una opción muy popular de esteroide oral entre muchos atletas, principalmente aquéllos del género masculino. La mayoría de los atletas frecuentemente había experimentado un aumento de peso general de aproximadamente 10 a 15 lbs o más, dentro de dos semanas con la administración de este compuesto. Esto claro, había sido en gran medida atribuido a la tremenda cantidad de retención de agua que tenía y un aumentó los diámetros del músculo que a su vez, daba, la apariencia del tamaño. Un efecto ventajoso de la retención de agua sin embargo, había sido la habilidad de haber eliminado, o habiendo aliviado problemas de los tendones. Esto se había apreciado a menudo por la mayoría de los atletas, cuando esta característica frecuentemente había permitido intensos entrenamientos que tenían previamente un poco restringidos, debido al dolor agravado asociado en los tendones. El Anapolon permitía a los músculos absorber más oxígeno. Esto generalmente produce que el músculo pueda soportar una mayor tensión física debido al aumento significativo en el volumen de sangre.

Otros atletas manifiestan que usandolo les permitía una mayor duracion del entreno y una mayor recuperacion.

Sin embargo, aunque la substancia de Anapolon era poderosa, desgraciadamente, también tenía reacciones adversas serias fuera de cualquier compuesto de los esteroides oral o inyectable. Unos atletas habían experimentado retención de agua excesiva que a veces había producido elevaciones de tension. Anapolon era además muy tóxico al hígado, debido a las características de ser un alfa de C-17.

<http://www.factorestetica.com>

No era conveniente su uso por los principiantes , y sólo se había usado por algunos atletas después de haber logrado un cierto desarrollo.

ANDRIOL: Andriol, es una única versión de undecanoate del testosterona desarrollada por Órganon. Esta versión de testosterona esta basado en el aceite y se sella en una cápsula a ser tomada oralmente. Según el fabricante, este método desvía el hígado y entra en el cuerpo como una grasa a través del sistema linfático. En las dosis de menos de 240mg por dia los efectos generalmente no existan. Con las dosis más altas, los efectos son pequeños . Generalmente, usuarios del esteroide experimentados con cualquier anabólicos fuerte no notaran gran cosa con el uso de Andriol. Combinado con otro anabólicos puede ser efectiva pero aun asi esto debe cuestionarse.

ANDRODERM: Androderm es un parche trans dermal, diseñado para soltar testosterona durante un periodo de 24 horas. Este producto está usándose principalmente por hombres más viejos que han alcanzado una edad en que allí el cuerpo ya no produce cantidades suficientes de testosterona (" Andropausia"). Cada parche contiene 12.2gm de testosterona, pero según el papel se dispersan sólo aproximadamente 2.5mg en cada 24 aplicación de la hora. Dos parches normalmente son la mayoría usado, y se aplica a al abdomen, parte de atrás, muslo o brazo superior. Los atletas encentrarían esta dosificación indudablemente insuficiente, y probablemente evitará todo juntos este producto. Realmente tendrian que ser usados varios parches para conseguir un efecto fuerte, siendo más fácil de usar una testosterona inyectable.

ANDROSTANOLONE: Es casi idéntico a la propia dihydrotestosterone del cuerpo que, como nosotros sabemos, se forma por la conversión periférica de testosterona. Algunos llaman Androstanolone por consiguiente a un dihydrotestosterone sintético. Este esteroide tiene un efecto predominantemente androgénico y, debido a su estructura, no puede convertirse en el estrógeno. Para un aumento rápido de poder y masa del músculo Androstanolone es de valor pequeño. Era el esteroide de la competición favorito del atleta porque ayuda a obtener un músculo más duro a

través de un más bajo volumen gordo aumentando el nivel del andrógeno sin aromatizar. Otra característica positiva es que la versión inyectable no es mas tóxica. Hoy, sin embargo Androstanolone raramente se usa por atletas. Una razón para esto es que casi todos compuestos europeos y americanos no estan disponibles. La otra razón es que la mayoría de los atletas usa el todavía Masteron disponible que tiene los efectos similares. Ni el original ni una imitación de Androstanolone estan disponibles en el mercado negro.

[Volver](#)

C

CATAPRES: Es una droga antihipertensiva. En la medicina escolar se usa para reducir la presión de sangre alta. La presión de sangre alta causada por los esteroides puede ser bajada tomando Catapres. Los atletas se interesaron en esta droga cuando la investigación médica infirmó que Catapres estimula la producción endógena de las hormonas de crecimiento. También debe tomarse antes de ir a dormir por la noche y por la mañana inmediatamente después de levantarse. Algunos atletas toman una 0.3 mg por la noche y 0.15 mg en un estómago vacío inmediatamente después de despertarse por la mañana. Los dosis nocturnas aumentan la concentración de hormonas de crecimiento durante varias horas que entonces de nuevo puede aumentarse tomando la dosis de la mañana. Los atletas, sin embargo raramente lo usan ya que tiene varios efectos indeseables como el letargo, fatiga, boca seca, perturbaciones de potencia, y vértigo Aquéllos que tienen la presión de una sangre baja y una proporción del corazón baja debe ser sumamente cuidadosa al usarlo. Cien laminas estarán aprox. disponibles para \$60. en el mercado negro.

CLEMBUTEROL: Es medicamento usado a lo largo de muchas partes del mundo como un broncodilator para el tratamiento de asma. Clenbuterol es una beta - 2 agonista, con las propiedades algo similar a la adrenalina. Normalmente actúa como un estimulante de CNS y usuarios el informe los efectos laterales como las manos inseguras, el insomnio, sudando, la presión de sangre aumentada y náusea. Estos efectos laterales generalmente menguan rápidamente una vez que el usuario se vuelve acostumbrado a la droga. Atletas encuentran el clenbuterol atractivo por su

<http://www.factorestetica.com>

efecto termogenico pronunciado. Los regímenes de la dosificación variarán, mientras dependiendo del efecto deseado. Clenbuterol generalmente vienen que es 20mcg laminas, aunque también está disponible en jarabe y en forma inyectable. Los usuarios normalmente encallarán allí individualmente la dosificación, mientras dependiendo de los resultados y los efectos laterales, pero en alguna parte en el rango de 2-8 laminas por día es muy común. Para la pérdida gorda, el clenbuterol parece quedarse eficaz durante 3-6 semanas, entonces las propiedades termogenicas parecen menguar. Actualmente, las falsificaciones de clenbuterol existen, pero son escasas.

CLOMIFEN: Se prescribe típicamente para las mujeres para ayudar en la ovulación. En los hombres, la las causas de aplicación de Clomid son una elevación de folículo la hormona estimulante y hormona del luteinizing. Como resultado, la producción del testostosterone natural también se aumenta. Este efecto es evidentemente beneficioso al atleta, sobre todo a la conclusión de un ciclo cuando los niveles del testostosterone endógenos son anormales. Cuando un atleta discontinua el uso de esteroides, su testostosterone probablemente se suprimirá. Si no se traen los niveles del testostosterone endógenos a sus valores normales, se producira una pérdida dramática en el tamaño y fuerza . Clomid juega un papel crucial previniendo esta caída en la actuación atlética. Una succión diaria de 50-100 mg de citrate del clomiphene durante un periodo de dos semanas devolverá la producción de testostosterone endógena a un nivel aceptable. Clomid levantará los niveles del testostosterone gradualmente. El atleta normalmente usará HCG durante un par de semanas, y continuara el tratamiento con Clomid. Clomid también es eficaz como un anti estrógeno. La mayoría de los atletas padecerá un nivel del estrógeno elevado a la conclusión de un ciclo. Un nivel del estrógeno alto combinado con un nivel del testostosterone bajo pone a un atleta en el riesgo serio de desarrollar una ginecomastia. Con la toma de Clomid, el atleta consigue el efecto dual de bloquear fuera algunos de los efectos de estrógeno, mientras también aumenta la producción de testostosterone endógena. Respecto a la toxicidad y efectos del Clomid es considerado una droga bastante segura. Los culturistas raramente experimentan cualquier problema, pero los posibles efectos laterales incluyen llamaradas calientes y la visión borrosa temporal. El citrate de Clomiphene está extensamente disponible

<http://www.factorestetica.com>

en el mercado negro. Hasta recientemente, era relativamente fácil de encontrar en el extranjero. Sin embargo, desde que el DEA está jugando un papel activo Clomid está poniéndose más duro de obtener. Los precios actuales están entre \$2-\$4 por 50 pastillas . Frecuentemente se ven Genericos como el citrate de Clomiphene por Anfarm en Grecia en el mercado negro .

CLOMIFEN: Cyclofenil es similar a HCG y Clomid en la acción. Esta droga normalmente se usa para aumentar la testosterona endogena después de un ciclo en un esfuerzo por evitar una caída dura mientras se espera a que las hormonas nivelen naturalmente su equilibrio. Similar a HCG y Clomid, el cyclofenil actua rápida y eficazmente aumentando los niveles naturales. Anecdóticamente sin embargo, el cyclofenil tiene la reputación de ser el más débil de los tres. Cyclofenil también puede actuar como un anti estrógeno, ligandose a los receptores de estrógeno y bloqueandolos . Esto es especialmente útil cuando se suprimen los niveles del testosterone naturales y un exceso de estrógeno puede estar presente en la terminación del esteroide. También debe notarse que algunos atletas han experimentado con no usar el cyclofenil. Se encuentra facilmente en el mercado. Actualmente, las imitaciones no deben ser un problema con este producto

CYTADREN: Cytadren, es la marca de un compuesto llamado aminoglutethimide, es una droga interesante (no es un esteroide). Es muy popular entre atletas competitivos que la han probado, esta substancia no se prohíbe actualmente . Cytadren inhibe la producción de andrógenos, estrógeno y cortisona. Médicamente, esta droga se usa tratar el síndrome de Cushing, una condición en que el cuerpo superproduce la cortisona. Mientras los andrógenos dan un mensaje a las células del músculo para aumentar la síntesis de la proteína, la cortisona da el mensaje opuesto .Cytadren inhibe producción de estrógenos.

La investigación está desnuda acerca de la mejor manera para administrar Cytadren, pero la evidencia anecdótica sugiere su uso de 2 días seguidos y 2 días de descanso. Una cosa es segura, cuando es usado por individuos sanos como un anti-catabolico, Cytadren no puede tomar a diario. Después de un periodo corto de uso regular, su cuerpo reacciona a la bajada de los niveles de cortisona bajada y como

respuesta aumenta los niveles de . ACTH haciendo Cytadren practicamente inútil. Los atletas han experimentado con dosis de 1/2 pastilla a 3 pastillas como dosis diaria, (250mg), 1 o 2 pastillas parecen ser lo normal.

Cytadren produce efectos secundarios numerosos. Estos incluyen, fatiga, vértigo, desorden, apatía, la depresión, nauseas / vomitos, trastornos de estomago, problemas de tiroides y enfermedad hepatica. Los atletas también informan que la cortisona reducida provoca a menudo dolores en los tendones y una susceptibilidad a las lesiones Actualmente Cytadren es caro, alrededor de \$2 por pastilla.

[Volver](#)

D

DANOCRINE: Es una antigonadotropina. Tiene un par de nombres comerciales populares: Danatrol, Winobanin, Anargil, y Mastodanatrol. Danocrine no tiene ningún efecto anabolico si tiene un efecto androgénico ligero. Se usa a menudo para tratar desórdenes como la ginecomastia. La dosis diaria es de alrededor de 400mg por día. No es un producto muy popular ya que es duro de encontrar en el mercado negro. El precio, para 100 capsulas de 200mg cada uno cuesta \$330-\$390.

Los posibles efectos secundarios: (dependiendo claro de la dosis) llamaradas de calor transpiración, líbido aumentada y la presión de sangre alta.

DECA DURABOLIN: Es la marca que fabrica Organon para el decanoate del nandrolone. Es uno de los esteroides inyectables más populares. Tiene efectos secundarios androgénicos mínimos. Considerado por muchos el esteroide global mejor para usar un hombre (los efectos laterales vs. los resultados) Deca normalmente inyectado por la mayoría una vez por semana con una dosificación de 200-400mg. Con esta cantidad, la conversión del estrógeno es ligera. Son raros los problemas con la presión de la sangre o los niveles de colesterol. Con dosificaciones más altas, los efectos laterales pueden ser mas frecuentes, pero aun asi se tolera bien la droga. También debe notarse que en los estudios de HIV, Deca se ha mostrado no sólo eficaz para el culturista tambien es beneficioso para el sistema inmunológico. Para el culturismo, Deca puede incorporarse eficazmente en ciclos de

<http://www.factorestetica.com>

masa y los ciclos de definicion. Un inconveniente del Deca es que puede descubrirse en un analisis de droga un año después del uso. Desgraciadamente para muchos atletas competitivos, esto hace Deca y otros productos del nandrolone no puedan ser usados. Deca también es un anabolico comparativamente caro. El mercado negro, 200mg de Deca costarán más de \$20 en la mayoría de los casos. Uno normalmente encontraría la versión veterinaria mexicana Norandren 50 de Brovel en México . Deca - también se encuentran normalmente en Grecia, que normalmente es ligeramente más barato. Retabolil de Bulgaria (" Deca ruso") normalmente es otro producto. Estas ampollas vienen en cajas de 25mg y 50mg.. Las ampollas no tienen ninguna venda alrededor del cuello y ninguna raya. La caja más grande viene con una marca para abrir la ampolla. Deca también se falsifica ampliamente en las formas innumerables debe comprarse con cautela si se compra en el mercado negro.

DIANABOL: Dianabol, lo fabricaba la marca Ciba en pastillas de 5mg de methandrostebolone, siempre ha sido uno de los esteroides anabolicos mas populares de los disponibles. La popularidad de Dianabol proviene de que los efectos son casi inmediatos y muy fuertes. 4-5 pastillas por día son bastante para dar resultados dramáticos a cualquier persona. Con unos efectos anabolicos y andrógenos tan fuertes traen consigo efectos secundarios. Dianabol se convierte en estrógeno, por lo que la ginecomastia y retención de agua puede ser un problema aunque normalmente se relaciona con la dosis . La agresión puede aumentar, y los usuarios informan a menudo un sentimiento de euforia . El hecho es que Dianabol se ha vendido en el mercado americano durante casi 10 años hoy en dia se ha parado su produccion y solo se consigue en el mercado negro, es un esteroide muy popular en el U.S.. Las versiones más populares en EE.UU. son las pastillas rusas que entran por la costa oriental, Pronabol de India y Refovit de Mééxico. El Dianabol ruso ha estado perdiendo su reputación como una compra segura. Los usuarios generalmente no sabrán si lo que ellos tienen es real hasta que ellos lo usen. Reforvit es un anabolico inyectable, que contiene 25mg / el ml de la substancia. Una botella de 50 ml contiene el equivalente de 250 pastillas y se vende a un precio razonable. La mayoría de los usuarios opta para tomarlo oralmente . Las pastillas tailandesas rosas también son populares y deben ser las únicas pastillas compradas

sin papel o caja. Éstas sólo se envían en las cantidades de 500 y 1000 . Methandon también está disponible en Thailandia, pero es mucho menos popular que las etiquetas de Anabol.

DNP: La substancia; 2, 4 - Dinitrophenol tiene muchos nombres de fábrica como, 1 Hydroxy - 2,4 - los dinitrophenol, Negro de Solfo, Nitrophen, Aldifen, y Chemox es entre otras muchas cosas, un estimulante metabólico. De hay la popularidad en nuestro deporte, quema la grasa como ningún otro producto. Es un tinte tóxico, químicamente relacionado a Trinitrophenol (el Ácido de Picric), se encuentra en los insecticidas, los preservativos de madera, los herbicidas, los explosivos, siendo un material arriesgado. Se usa para acoplar o atar las moléculas de ADN. No es un estimulante metabólico, como Clenbuterol o Triacana o Ephedrine o cualquier otro . Esta considerado un material peligroso. Emite humos tóxicos (o gases) al echarlo al fuego. Tiene un gran riesgo de fuego y explosión. No se puede exponer a fricción . La substancia puede absorberse en el cuerpo por la inhalación, a través de la piel y por la ingestión. Tiene grandes problemas físicos incluso puede causar la muerte, puede causar dermatitis, puede tener efectos en el sistema nervioso periférico. La substancia puede tener efectos en los ojos, produciendo cataratas. DNP es un agente que inhibe el flujo de electrones y bombea iones de H⁺ para la síntesis de ATP. Hace cincuenta años se usó para la pérdida de peso, sin embargo, en 1938 dejo de usarse por los riesgos que producía.

Usted puede estar preguntandose simplemente qué tipo de dosis sería eficaz, pero no perjudicial. Una dosis de 2mg / kg / día (o dos mg por kg de peso del cuerpo por día) sería una dosis eficaz, con esta dosis perderíais en torno a 5 a 10 libras en un periodo de 10 a 14 días, quizá menos.

DNP es muy difícil de encontrar hoy en día solo. Sigma y Springfield lo fabrican aunque ellos generalmente no venden al público.

DYNABOLON: Dynabolon es un ester de la nandrolone. Sólo se produce en Italia y Francia y tiene una reputación de ser más potente que otras nandrolones. Cada ampolla contiene 80.5mg de undecanoate del nandrolone, en 1 ml. Tiene una vida más corta en el cuerpo que Deca. El atleta generalmente opta por inyectarlo dos veces semanalmente. Hay algunas versiones falsas en el mercado.

[Volver](#)

E

Efedrina: Efedrina es una sustancia, que eleva la temperatura del cuerpo del usuario, efedrina produce calor o termogenesis, ayudando al cuerpo así a quemar más calorías que normalmente incluso en un estado de descanso .efedrina también estimula la glándula tiroidea y acelera el metabolismo. Para aumentar al máximo el efecto de calor(casi doblarlo) puede tomarse la efedrina con la cafeína y aspirina. Una combinación ideal para una persona para quemar la grasa muy eficazmente sería 25 mg de efedrina, 200 mg de cafeína, y 300 mg de aspirina, tres veces diariamente, treinta minutos antes de una comida. Otro gran atributo de la efedrina es su efecto en el sistema nervioso central ya que mejora la coordinación muscular. Una dosis de entre 25-50 mg de efedrina una hora antes de que un entrenamiento le da un empujón a un atleta en energía que puede producir un 5-10% de aumento en la fuerza. efedrina también tiene un efecto anticatabolico y suprime el apetito haciéndole un suplemento bueno para tomar mientras se hace dieta manteniendo el tamaño del músculo la fuerza. Se sugiere que la efedrina no se tome más de tres veces por semana cuando se usa para este propósito porque el cuerpo se acostumbra a el y el efecto disminuye, exigiendo dosis más altas para completar la misma tarea.

Los efectos secundarios son : el insomnio, los temblores, el latido del corazón rápido, los dolores de cabeza, el vértigo, la presión de sangre alta, y falta de apetito. Puede ser una droga muy peligrosa y no debe tomarse por nadie que tenga problemas de corazón, o la presión de sangre alta, ritmo del corazón irregular, o cualquier hyperfunction de la glándula tiroidea.efedrina también se vende en otras formas como las gotas, inaladores nasales, los polvos, etc...

EQUIPOISE: Contrapese, o undecylenate del boldenone, es el esteroide veterinario favorito de muchos atletas. Sus efectos son fuertemente anabolicos, y sólo ligeramente androgénicos. Proporcioná una ganancia firme y consistente en la masa y la fuerza. Sin embargo, se logran los mejores resultados cuando equipoise se usa junto con otros esteroides. Para la masa, el Equipoise funciona bien con Anadrol(oxymetholone), Dianabol(methandrostenolone), o una testosterona inyectable como Sustanon 250. El equipoise también es muy eficaz para la preparación del

<http://www.factorestetica.com>

concurso desde que aromatiza muy pobremente. Pueden mejorarse la dureza del musculo y la densidad cuando el Equipoise se combina con el hexahydrobencylcarbonate de Parabolan(trenbolone), Halotestin(fluoxymesterone), o Winstrol(stanozolol). Las dosificaciones medias de Equipoise son 200-400 mg por semana. Normalmente se ponen las inyecciones cada dos días. El Equipoise sólo está disponible en ampollas de 25 o 50 mg / la las inyecciones voluminosas pueden volverse un problema. Si las inyecciones son demasiado elevadas y demasiado frecuentes en el mismo sitio se puede producir un enquistamiento de aceite . Un enquistamiento de aceite se puede disipar a menudo solo, pero en los casos extremos, un doctor necesitara eliminarlo. Por consiguiente, los atletas deben tomar cuatela y deben rotar los sitios de las inyecciones. El equipoise no está facilmente disponible en el mercado negro americano, pero puede encontrarse. Una de las versiones más populares es Ganabol de Laboratorios V.M. en el Medio y América del Sur. Esta principalmente visto en ampollas de 50 ml, pero también está disponible en 10, 100, y 250 ml. Ganabol aparece en una ampolla de vidrio marron con una etiqueta verde. Las versiones de 50 mg tienen un numero "50" inscrito en la etiqueta. No hay ninguna falsificación de Ganabol. Se estima el precio de Ganabol en torno a \$8 por el ml. Este precio probablemente es alto . Un precio más típico es aproximadamente \$4-\$6 por el ml.

ESICLENE: Esiclene tiene algunas características muy raras. Permite a cualquier músculo aumentar en el tamaño dentro de un periodo muy corto de tiempo. Básicamente el esiclene estimula el tejido en el punto de inyección causando una inflamación ligeramente dolorosa e inflando el propio tejido del músculo. La inflamación es normalmente muy dolorosa y se debe a que las ampollas del esiclene contienen 20 mg de lidocaine, un analgésico . El hinchazón sólo dura durante aproximadamente cuatro a cinco días que hacen este anabolico muy popular antes de una competición para ayudar al tamaño - es bueno para los grupos musculares menos desarrollados. Esiclene se inyecta a menudo periodicamente para ayudar en la recuperacion. Esiclene sólo promete ganancias temporales de alrededor de 1-1.5 en en los brazos y hombros cuando se usa periódicamente las inyecciones de alrededor de 1ml el primer día y 2ml (uno por el músculo) los siguiente días. Es difícil de encontrar en el mercado negro, sin embargo, es muy económico. En Italia una

caja de seis ampollas cuesta aproximadamente \$8 y en el mercado negro una ampolla puede costar entre \$10 y \$12. Esiclene es un esteroide bueno para conseguir los músculos mas duros y porque no tiene efectos secundarios (salvo el dolor) es una droga popular para hombres y " mujeres.

ESTANDRON: Este esteroide inyectable es una mezcla de tres diferentes testosteronas y una pequeña porción de estradiol, una hormona sexual femenina. La composición de testosterona de Estandron es similar a la encontrada en Sustanon pero contiene una sustancia de testosterona menos (Testosterona decanoato). Como otros componentes inyectables de testosterona Estandron es también extremadamente apropiado para una rapido desarrollo de fuerza y masa muscular. Es altamente androgenico y tiene y sirve como mejorador de la sintesis de proteína y anticatabolico. Estandron también mejora la habilidad del cuerpo para regenerarse, lubrica las juntas almacenando fluido en el tejido conectivo, y esto aumenta los niveles de glicogeno en las celulas musculares. A primera vista parece raro que el estradiol sea incluido en el estandron, la respuesta es simple, esta dirigido a las mujeres y no a los hombres. Este esteroide desarrollado por Organon Company es una combinación de estrogenos y androgenos que es usada para tratar trastornos del climaterio en las mujeres. El estradiol neutraliza el efecto de las testosteronas incluidas, evitando el efecto de masculinización en mujeres. Esta es una combinación que ofrece a los culturistas ventajas y desventajas. La mujer que utiliza este esteroide puede conseguir buena ganancia sin efectos adversos de la masculinización. Lo mismo ocurre con los hombres que pueden experimentar acne, caída de pelo o problemas en la próstata cuando consumen testosterona adicional, el estradiol de este compuesto disminuye y contraataca estos efectos. Desde que pequeñas cantidades de estrogeno son también anabólicas y en particular estimulan la circulación sanguínea, seria también una razón de porque estandron le da a sus usuarios una considerable ganancia en masa muscular.

Por otra parte el estrogeno refuerza el almacenamiento de calcio en los huesos.

Pero desafortunadamente el estradiol puede llevar a la formación de edema y al aumento de peso en ambos sexos.

Un considerable riesgo de ginecomastia en fisicoculturistas hombres esta también presente. La producción de testosterona endogena se reduce también, y la presión sanguínea puede aumentar.

El dosage para hombres es de 3 a 5 mililitros por semana. Un ejemplo podria ser una toma de 3 ml de estandron a la semana y 200 miligramos de Primobolan a la semana o 200 de decadurabolin a la semana. Los que quieren ganar masa rápidamente sin importar su consistencia o calidad del músculo pueden tomar 5 ml de Estandron a la semana mas 200 de decadurabolin a la semana mas 30 Mg. de Dianabol pero por día. Las mujeres pueden tomar 1-2 ml de Estandron por semana. En Estados Unidos hay varias drogas con una composicion similar a Estandron por ejemplo Depo Testadiol de Schein Company que contiene 50 Mg. de testosterona cypionate y 2 Mg. de estradiol por ml. La ampolla de 10 ml cuesta en EEUU 13.79\$, la versión genérica cuesta 7\$.

[Volver](#)

F

FINAJET: Parabolan acetate 50 cc ampollas. Este es un esteroide veterinario basado en aceite proveniente de Europa. Es un derivado de 19 Nortestosterone. Finajet tiene altas propiedades anabólicas, moderadas propiedades androgenicas. Puede ser toxico para el hígado en excesivas dosis. Es un acetado que actúa rápidamente, se aplica diariamente. Los atletas reportan muy buenas ganancias en fuerza con mínima retención de agua o ganancias de peso. Algunos sienten que es muy efectivo para hacer mas duro un físico musculoso, es adecuado para usar antes de la competencia. Esta droga tiene un alto contenido de andrógenos para la mujer, aun en pequeñas dosis. Un alto numero de reacciones alérgicas a esta droga han sido vistas. Casi un 10 % de los atletas que usan Finajet reportan mucho dolor en la zona de la inyección y síntomas tipo resfrío. Esta es la mayor desventaja de la droga. Los dosages efectivos están entre 0.5 cc a 1 cc diariamente.

[Volver](#)

H

HALOTESTIN: Halotestin es el nombre comercial de fluoxymesterone. Es un muy fuerte andrógeno oral con solo un leve efecto anabólico. El fuerte componente andrógeno genera aumentos en la fuerza con poca ganancia en peso. Por eso es generalmente usado por levantadores de pesas o aquellos que necesitan estar fuertes. Halotestin tiene como dijimos fuertes efectos androgenicos, que la hacen una sustancia a tratar con cuidado. Esta sustancia no se convierte en estrógeno por lo que es uno de los favoritos a ser usado en competición. Ocasionalmente se lo ha encontrado en el mercado negro y no es muy falsificado. En México se encuentra bajo el nombre de Stenox in tabletas de 2.5 mg.

HCG: La descripción HCG, o gonadotropina del chorionic Humano se deriva de la orina de mujeres embarazadas es una droga inyectable disponible comercialmente en los Estados Unidos así como en muchos otros países. Pregnyl, hecho por Organon, y Profasi, hechos por Serono, se usan para el tratamiento testicular en los muchachos muy jóvenes, hypogonadismo (la subproducción de testosterona) y como una droga de fertilidad ya que ayuda induciendo a la ovulación en las mujeres. Entre atletas, HCG es usado para estimular la producción de testosterona natural durante o después de un ciclo de esteroide que ha reducido los niveles naturales. Detener un ciclo de esteroides bruscamente, sobre todo cuando los andrógenos endógenos están ausentes, puede causar una pérdida rápida en el músculo recientemente adquirido por el atleta. Usando HCG se estimula la producción natural, y se evita una caída pronunciada . Aunque las imitaciones no son muy comunes, existen y deben evitarse. Más de un atleta ha informado de efectos secundarios desagradables (la fiebre, dolores) debido a una imitación estéril . HCG siempre se empaqueta en 2 ampollas diferentes, una con un polvo y el otro con un disolvente estéril. Estas ampollas necesitan ser mezcladas antes de inyectarlo, y refrigeradas si se usa más tarde.

[Volver](#)

L

LAURABOLIN: La descripción Laurabolín es un esteroide veterinario inyectable que contiene laurate de nandrolona. El laurate de Nandrolona es básicamente un deca largo, que queda activo un mes en el cuerpo. Los atletas generalmente inyectan esta droga una vez por semana. Siendo una nandrolona, Laurabolín exhibirá un efecto anabólico muy grande con efectos andrógenos moderados. Aunque muchas mujeres usan el nandrolona, Laurabolín se debe evitar. Los efectos androgénicos pueden aparecer en las mujeres con las nandrolonas. Para los hombres, las dosis de 200-400mg por semana parecen funcionar bien.

[Volver](#)

M

MASTERON: Masteron, o propionate del drostanolone, es un esteroide popular entre los culturista competitivos. Normalmente se usa en la preparación del concurso por muchas razones. Para empezar el propionate del drostanolone es un derivado de DHT(dihydrotestosterone), y por consiguiente, no aromatizará en estrógeno. Los culturista que compiten encuentran esto sumamente beneficioso porque la aromatization causa retencion de agua que puede dar una apariencia lisa a los músculos. Otra ventaja de Masteron es su componente androgénico fuerte. El efecto androgénico de este esteroide puede causar una mejora notable en la densidad del músculo y dureza que pueden ayudar a que el culturista obtenga definicion. El efecto androgénico también es crucial porque ayuda a proporcionar el empuje necesario para el intenso entrenamiento cuando un atleta ha bajado su consumo de calórias para la preparación del concurso. El atleta puede tomar Masteron aproximadamente diez días antes de una prueba de droga ya que no aparece en ese tiempo en una analitica. La dosis media de Masteron es de 100 mg cada dos días. Es mejor inyectar Masteron cada 2-3 días porque tiene una duración corta de efecto. Esteroides populares para mezclar con Masteron son hexahydrobencylcarbonate de Parabolan(trenbolone), Winstrol(stanozolol), y oxandrolone. Atletas raramente se experimentan efectos secundarios con este esteroide. Masteron no es hepatotxico, no provoca ginecomastia ya que no se convierte en estrogeno. Posibles efectos secundarios incluyen acné, la pérdida de pelo acelerada, y aumentaron la agresión. La desventaja principal de Masteron es su disponibilidad muy pobre en el mercado negro y su precio alto. Masteron de Bélgica esta en una caja de dos ampollas. Cada 2 ml contienen 100 mg de propionate del drostanolone. Uno de estas cajas puede costar bien encima de \$50 en el mercado negro.

MAXIBOLIN: (ethestrenol) 2 mg en tabletas 100 mg en botella Este es un esteroide con bajo efecto androgenico en forma oral, que deriva de la 19-nortestesterona. Esta droga es popular entre las mujeres que aprecian sus altas propiedades anabólicas. Algunos atletas encuentran a esta droga efectiva para la ganancia de masa muscular de calidad especialmente cuando se combina con otros esteroides. La retención de agua y la conversión en estrógenos es mínima. Esta droga es moderadamente toxica al hígado in altas dosis. No se usa mucho en los

<http://www.factorestetica.com>

Estados Unidos, los que lo usaban se quejaban de que altas dosis se necesitaban para conseguir resultados, del orden de los 20 mg a 40 mg diarios.

METANDREN: (methyltestosterone) 5 y 10 mg/tableta bucal, 25 mg tableta oral o 100 por frasco. Es una testosterona oral. Es mas androgenica que anabólica. Aromatiza fácilmente y es toxica para el hígado. Este producto fue desarrollado muchos años atrás y es completamente obsoleto hoy. Aun muchos atletas toman la droga para promocionar la agresión. Este a veces es un efecto deseado en levantadores de pesas y atletas competitivos. La droga penetra en el sistema muy rápido en solo una hora su efecto androgenico puede ser sentido. Los levantadores de pesas afirman que esto ayuda a su fuerza cuando lo toman antes de un entrenamiento o competencia. No es bueno para generar tamaño y fuerza duraderos. La dosis promedio es de 20 mg a 50 mg diarios.

METILTESTOSTERORA: Es uno de los más antiguos esteroides orales disponibles. Es producido por muchos laboratorios y vendido en muchos países. Es muy androgenico con pocos efectos anabólicos. Para propósitos atléticos, es usado para estimular la agresión entre levantadores de pesas y aquellos que buscan agregar peso a sus entrenamientos.

Muchas tabletas de metiltestosterona son sublinguales (se la coloca debajo de la lengua) para rápida absorción. Las tabletas tienen gusto a cítrico. Un par de tabletas ubicadas bajo la lengua antes de ir al gimnasio pueden aumentar la agresividad de un entrenamiento. Tiene pocos efectos androgenicos colaterales. Es completamente toxica, eleva las enzimas del hígado causando acné, ginecomastia, agresión y retención de agua. Ofrece algunas leves ganancias en fuerza. Para los que buscan masa muscular de calidad, no sirve.

Los esteroides falsos usualmente contienen metiltestosterona. Es debido a que es barata y puede engañar a un usuario inexperto.

MIOTALAN: Miotolan, proviene de una sustancia llamada furazabol fue un popular esteroide a finales de los ochenta porque era indetectable en el sistema de una persona. Desde 1990 ha sido detectado, y desde entonces se torno menos popular, tiene una vida media de solamente alrededor de una semana. Este esteroide es

mayormente usado para propósitos médicos en el tratamiento de arteriosclerosis y otras enfermedades que se benefician de un esteroide que reduce los lípidos. Miotolan tiene un muy potente efecto androgenico y promueve buenas ganancias con poca retención de agua y sal. En pequeñas dosis 2 a 6 mg al día, tiene baja ocurrencia de aromatización, aunque, para que la droga sea efectiva los dosages deben estar en alrededor de 10 - 20 mg/dia. A esta dosis, hay chances de que el hígado se envenene. Miotolan no es popular en el mercado negro porque su costo es mucho mas elevado comparado con otros esteroides mas efectivos. Es difícil predecir cuales son los precios.

[Volver](#)

N

NORANDREN 200: Norandren 200 es otra versión veterinaria de deconate del nandrolone, igual que Norandren 50. La única diferencia es que son 200 mg / el ml mientras norandren 50 es 50 mg / el ml. Deca - Durabolin también es la misma sustancia, siendo la versión humana más popular. Considerado por muchos el esteroide global mejor para usar un hombre (los efectos secundarios vs. los resultados) Deca normalmente es inyectado por la mayoría una vez por semana con una dosificación de 200-400mg. Sólo deben tomarse los deconate del nandrolone en las dosificaciones entre 50 y 100 mgs por semana para las mujeres.

NORANDREN 50: Norandren 50 es el mismo producto químico que el deca durabolin sólo que es la versión veterinaria. Probablemente es el compuesto del esteroide más popular usado en los deportes. Para más información puedes buscarla en el perfil del deca durabolin. Si usted está considerando tomar cualquier versión veterinaria de un esteroide humano, TENGA CUIDADO CON, estas drogas no se hacen los mismos controles que con las drogas de uso humano.

NUBAIN: Nubain es un analgésico, un narcótico que alivia el dolor. Se extrae del opio. Nubain es un narcótico muy potente de efectos similares a la morfina. Su nombre químico es nalbufina HCL, un opiáceo agonista-antagonista sintético. Los culturistas lo utilizan porque mitiga al dolor de las articulaciones y de los músculos consecuencia del uso de pesos excesivos y de entrenos intenso, sobre todo durante la precompetición. Hay gente que cree que nubain además les suprime el apetito, pero su principal característica es la de controlar la producción de cortisol y reducir el dolor. Los culturistas lo usan por la misma razón que los drogadictos para escapar de las presiones del mundo real y flotar en una nube de intenso placer durante unas horas. Hace que las sesiones mas intensas y dolorosas resulten agradables. Sin el muchos no serian capaces de llevar a cabo los entrenos debido a las lesiones (muy frecuentes entre los culturistas profesionales y de categoría internacional). Esta fármaco permite a los deportistas lesionados entrenarse eliminando el dolor el tiempo suficiente para completar la rutina. Si bien Nubain posibilita que se entrene con una lesión a largo plazo puede ser perjudicial ya que se

<http://www.factorestetica.com>

durante su uso uno sigue haciéndose daño en la lesión. Nubain puede generar tanta adicción como la morfina y la heroína. Abandonar su consumo puede resultar mucho mas complicado , este fármaco ha destrozado muchas vidas. Además del riesgo de adicción existen otros efectos secundarios como sudoración , sofocos, nauseas, vómitos, mareos, sequedad de boca, nerviosismo, depresión, desasosiego, ganas de llorar, euforia, distorsiono de la imagen corporal, pesadillas, confusión, alucinaciones, entumecimiento, sensación de hormigueo, cefaleas, hipertensión, o hipotensión, bradicardia, taquicardia, calambres abdominales, fiebre, congestión nasal, amargor de boca, quemazón al orinar, depresión respiratoria, dificultades para hablar y visión borrosa. No esta mal ¿verdad?.

Los deportistas que intentan desengancharse del Nubain experimentan los mismos síntomas que los que intentan dejar otros narcóticos. Es como luchar contra el demonio.

[Volver](#)

O

OMNADREN: Omnadren 250 es un inyectable basado en aceite que contiene una mezcla de cuatro diferentes testosteronas: testosterona propionato 30 mg, testosterona fenilpropionato 60 mg, testosterona isohexanoate 60 mg y testosterona hexanoate 100 mg. Muchos atletas lo comparan con el Sustanon. Omnadren contiene testosterona propionato y testosterona fenilpropionato en la misma cantidad que Sustanon, aunque la testosterona isohexanoate y testosterona hexanoate remplazan a la testosterona isocaproate y testosterona decanoate en Sustanon. Como resultado, Omnadren tiene un muy diferente efecto que Sustanon. Para comenzar con estos, los usuarios de Omnadren experimentaran fuerte retención de agua. Esta característica lleva a rápidas ganancias en tamaño y fuerza, pero también causa que los músculos se vean suaves y aguosos. A diferencia de sustanon,

Omnadren se convierte rápidamente en estrógeno, lo que puede causar ginecomastia. Estos efectos pueden ser contrarrestados con el uso de Nolvadex. Las dosis van de los 250 mg por semana a 1000 mg o mas por día. Un dosaje adecuado estará en el rango de 250 a 1000 mg por semana. Omnadren es activo en el cuerpo por pocas semanas, pero la inyección debe aplicarse una vez a la semana. Muchos atletas prefieren una combinación de Omnadren con un fuerte anabólico como Deca (nandrolon decanoate o Equipoise (boldenone undecylenate). Los levantadores de pesas y los atletas que buscan una dramática ganancia en masa y fuerza prefieren combinar Omnadren con anabólicos orales potentes como Anadrol y Dianabol. Omnadren tiene un uso limitado en periodo pre competencia debido a la fuerte retención de agua que produce.

Un año atrás, Omnadren era raro en el mercado negro de Estados Unidos. En los pasados meses el mercado se ha llenado con Omnadren contrabandeado desde Polonia. Para dar un ejemplo, 500000 ampollas de Omnadren, fueron supuestamente retenidas por la policia. El precio de este producto es mas bajo que Sustanon, con un precio de 15 dólares. Omnadren era originalmente manufacturado por Polfa, pero actualmente lo manufactura Jelfa en Polonia. Cinco ampollas vienen protegidas por un papel blanco o envoltorio de plástico dentro de una caja rosa y blanca. Las viejas cajas son de color gris y azul y pueden aun estar circulando en el mercado negro. Las ampollas están hechas de cristal claro y están impresas

<http://www.factorestetica.com>

con tinta roja. Las ampollas viejas están impresas con tinta negra. No parece haber mucha falsificación de este producto en el mercado negro. La revista mundial de Anabólicos menciona una falsificación en la cual "Omnadren 250" esta impreso en el tercio superior de la caja y no en el tercio inferior. Supuestamente, el paquete completo esta impreso en Ingles y no en Polaco. Sin embargo estas falsificaciones no parecen prevalecer en el mercado actualmente

ORETON: (testosterona propionato) 100 mg/cc o 30 cc en ampollas Oreton es una testosterona de acción rápida basada en aceite. Es muy similar a la Depo Testosterona excepto que es solamente efectiva en el sistema por alrededor de 5 días. Aunque las aplicaciones se hacen dos veces a la semana. Esta droga puede ser efectiva para obtener fuerza como otras testosteronas y causa un numero de efectos secundarios. Ginecomastia, retención de agua, y agresión son los más comunes. Pocos atletas usan Oreton porque es difícil de conseguir . La droga tiene efectos similares a la Depo Testosterona. Las dosis promedio son 200 mg a 400 mg por semana.

OXANDROLONA: La descripción Aunque Oxandrolona está disponible en el EE.UU. bajo la marca Oxandrin, su precio en el mercado negro es mas barato. Oxandrolone tiene una reputación de ser uno del anabolicos más seguros disponibles , es suave . Se da a menudo a mujeres y niños esta droga sin efectos secundarios adversos. Para los atletas, es un anabolico suave que normalmente aumenta la masa muscular con una retención de agua muy pequeña. Posiblemente una de las características más deseables de él es que no aromatice a ninguna dosificación. Otro atributo que Oxandrolone tiene es que, al contrario de la mayoría de las sustancias esteroidales , no suprime la producción natural de testosterone. Una dosificación común de Oxandrolone es diariamente alrededor de 25mg. Normalmente se mezcla con otros esteroides debido a sus pocos efectos secundarios. Posiblemente la mezcla mas popular que usa Oxandrolone es con 50mg Winstrol cada dos días, 50mg Testosterone Propionate cada dos días, y 25mg Oxandrolone todos los días. Debido a su precio alto, es duro de encontrar en el mercado negro y debe examinarse cuidadosamente si se encuentra. No hay ninguna forma inyectable de Oxandrolone actualmente.

[Volver](#)

<http://www.factorestetica.com>

P

PRIMOBOLAN: Primobolan tabletas proviene de la sustancia methenolon acetato. Es una muy popular elección para los que recién se inician en los esteroides y mujeres por su baja tasa de efectos colaterales. Primobolan se usa generalmente por largos periodos debido a su baja efectividad. Es un esteroide oral, que sin embargo no es peligroso como otros para el hígado. Muchos atletas han reportado buenas ganancias cuando lo usan junto con otro esteroide de propiedades androgenicas moderadas, como winstrol, parabolan, masteron o equipoise. Cuando se usa solo no debe esperarse grandes ganancias. Una dosis común de este esteroide esta en los 75 a 150 mg para hombres y entre 25 a 100 mg al día para mujeres para un ciclo de entre 6 a 12 semanas. Si se usa solo, la virilización y la aromatización no son usualmente un problema. Pueden ocurrir todos los efectos secundarios comunes, pero no aparecen al menos que la persona tenga una predisposición.

Primobolan esta disponible en 5 mg a 25 mg producido por el laboratorio Schering. Se producía en tabletas de 50 mg, pero no se las produce mas.

PRIMOBOLAN DEPOT: El Primobolan depot es un esteroide inyectable producido por Schering y vendido en varias partes del mundo. Contiene enanthate de metenolone que es un anabolico con las propiedades androgénicas sumamente bajas. Las propiedades anabolicas de este esteroide también son suaves. Primobolan normalmente es usado por la mayoría durante ciclos de definicion aunque algunos usuarios lo mezclan con drogas más fuertes como el testosterone y Dianabol durante ciclos de masa. Esta droga normalmente es inyectado por la mayoría varias veces a la semana con dosificaciones muy amplias. 100-200 mg de Primobolan a la semana no deben interferir con los niveles del testosterone naturales y no debe producir los efectos secundarios notables. Entre atletas, los principiantes responden a menudo a dosis de 200 mg semanales pero los usuarios regulares inyectan muchas dosis más altas que buscan un efecto del anabolico más

fuerte. El Primobolan depot entra en ampollas de vidrio de 1ml que contienen 100 mg de droga en Europa y 50mg a lo largo de las áreas de América del Sur.

PRIMOBOLAN: Las pastillas de Primobolan (acetato de methenolone) son una opción muy popular para los principiantes y mujeres debido a la proporción baja de efectos secundarios asociados con él. Primobolan normalmente se usa durante un periodo más largo de tiempo que la mayoría de los esteroides debido a su efectividad baja. Muchos atletas han informado de ganancias buenas al usar el primobolan junto con otros esteroides ligeramente androgénicos que no aromatizan como el winstrol, parabolan, masteron, . Al usar el primobolan solo, un atleta no debe esperar ganar mucho músculo y fuerza, sin embargo, puede obtenerse dureza que se mantiene después de un ciclo. Una dosis común de primobolan está alrededor de 75-150 mg / día para los hombres y entre 25-100 mg / día para las mujeres durante un ciclo de entre 6-12 semanas. Si usó solo, no tiene problemas secundarios y no se necesitan HCG u otras drogas de estímulo de testosterona. Las pastillas de Primobolan están actualmente disponibles en 5mg y 25mg (por Schering).

PRIMOTESTON DEPOT: Primoteston depot es una testosterona sintética que exhibe un efecto androgénico fuerte y características anabólicas buenas también. Primoteston usado con otros compuestos dará grandes resultados en casi todos los casos. A menudo se mezcla con sustanon 250 y un cypionate de la testosterona para conseguir mejores resultados.

PROVIRON: La descripción Proviron, o mesterolone, es un antiestrogeno muy popular usado por los culturistas. Previene la aromatización de esteroides por el estrógeno. Proviron es usado frecuentemente por atletas en ciclos pesados de esteroides para prevenir la ginecomastia. También su uso es favorable para los culturistas de competición por que baja el nivel del estrógeno aumenta la dureza del músculo y baja la retención de agua. Una o dos pastillas de 25 mg por día deben ser suficientes para prevenir la ginecomastia. Proviron también puede combinarse con el citrato de Nolvadex (tamoxifen) si se necesita. Los efectos secundarios son sumamente raros con las dosificaciones por debajo de 100 mg por día. Un problema

mayor del Proviron es que tiende a reducir las ganancias hechas de un ciclo. Esto es debido al hecho que Proviron es un andrógeno y por consiguiente enlaza en los sitios del receptor del andrógeno dentro del cuerpo bloquea los androgenos y dejan de hacer efecto. Por consiguiente, muchos atletas prefieren tomar el Proviron en su dosificación mínima para tener ganancias suficientes mientras previenen la ginecomastia. Proviron es normalmente bastante fácil de obtener en el mercado negro. La mayoría de las versiones se fabrica por Schering y cuesta aproximadamente \$1-\$2 por 25 etiqueta del mg. . No se conoce ninguna falsificación de proviron.

[Volver](#)

S

STEN: Es una mezcla de testosterona . Cada ampolla de 2 ml contiene 25 mg de testosterona propionato, 75 mg de testosterona cypionato y 20 mg de DHEA. Este esteroide contiene básicamente 50 mg de testosterona por ml. Con testosterona, 200-400 mg por semana es común, así que cuando se usa este compuesto, 3 o 4 ampollas deben ser inyectadas por semana en dosis divididas para alcanzar la dosis adecuada. Aun, esto agrega 6 a 8 ml a la semana lo cual es bastante cuando se lo compara a otros productos como sustanon. Por esta razón, Sten es usado generalmente cuando otras testosteronas no están disponibles. En México dos ampollas están empacadas en una caja con una jeringa de 3 ml y vendido por alrededor de 5 dólares. En EEUU , una ampolla de estén se vende a 10 \$. Este esteroide puede considerarse una compra segura.

STENOX: También conocido como Halotestin, tiene un efecto androgenico extremo y un bajo efecto anabólico. Con esta combinación, una persona puede esperar un gran aumento en la dureza de los músculos y fuerza pero no buenas ganancias en tamaño o peso. Debido a su alto nivel de efecto androgenico, los usuarios han reportado altos niveles de agresión haciendo sus entrenamientos muy intensos.

Una dosis común de Stenox esta en el rango 20-30 mg lo cual es entre 8 y 12 tabletas para un ciclo de 4 a 6 semanas . En este nivel un atleta puede esperar grandes ganancias en fuerzas con baja tendencia a la retención del agua. Stenox es considerado el mas toxico de los esteroides orales y tiene una alta tasa de efectos secundarios. Este hecho a mantenido a mucha gente, especialmente mujeres, lejos de este compuesto. Stenox es muy toxico para el hígado y no debe excederse los 30 mg al día. Su fuerte efecto androgenico han sido comúnmente responsables daño al hígado, dolores de cabeza, irritabilidad, agresividad, acne, dolor estomacal, virilización en mujeres y supresión de los niveles hormonales naturales.

[Volver](#)

T

TESLAC: La descripción Teslac no es ni un anabólico ni un esteroide androgénico. Se considera simplemente una hormona sexual que es pariente de la testosterona y se desarrolló para las mujeres con propósitos médicos. Teslac se usa ampliamente en la comunidad culturista como probablemente el antiestrógeno más eficaz. Cuando se combina con Proviron, Teslac previene la conversión del estrógeno completamente y los problemas asociados. Algunos han dicho que incluso suprime permanentemente la creación de estrógeno. Estimula la producción natural del cuerpo de testosterona eficazmente como la HCG. Realmente el único problema de Teslac es su precio sumamente alto. Un precio común en el mercado negro es en cualquier parte de \$215-\$230 para un paquete de 50 - 50mg etiquetas. A una dosificación común de 4-5 pastillas / día, esto es bastante caro. Para aliviar el costo un poco, la mayoría de los atletas lo apila con Proviron que es sin embargo probablemente más favorable. Una dosis usual es Teslac - - 1-2 píldoras / día y Proviron - - 50mg / día. Sin embargo, esto es duro de encontrar en el mercado negro. No hay actualmente ninguna imitación conocida de él debido a su costo alto. Los Efectos secundarios son La presión de sangre alta, comezón, el salpullido, dolor e hinchazón en las extremidades (los brazos y piernas), infección de la lengua, la pérdida de apetito, la náusea y vomitos. Los efectos secundarios son conocidos pero muy raros.

TESTOPRIN D: Es una mezcla de testosterona inyectable que esta disponible en México. Cada ampolla contiene 50 mg de testosterona propionate y 200 mg de testosterona enantate, disuelta en 1 ml de aceite. Son empacadas individualmente en cajas rojas y blancas aunque en Estados Unidos se venden sueltas. Este producto no es comun, lo cual es una de las razones por la que se lo encuentra generalmente en falsificaciones.

TESTOSTERONA CYPIONATO (TEXTES LEO): La descripción El cypionate de Testosterone es un eter de testosterona que es difícil encontrar. Antes era la forma más común de testosterona disponible para los atletas. Cypionato había ganado una reputación por ser ligeramente más fuerte que el enanthato y se había vuelto la <http://www.factorestetica.com>

testosterona mas usual para muchos. En general, las únicas versiones que usted encontrará en el mercado negro son Sten de México que contiene 75mg cypionato con 25 mg de propionate junto con algún DHEA y Testex de Leo en España que contiene 250mg cypionate . Las falsificaciones son bastante fáciles de obtener. Una dosificación corriente de cypionate está en el rango de 200-600mg por semana. Esta disponible por \$20 per10ml ampolla, muchos usuarios tomaran 2000mg por semana. Este tipo de dosificación sin embargo, es inseguro, generalmente no se necesita.

TESTOVIRON:

COMPOSICION POR UNIDAD: TESTOSTERONA , ENANTATO 250.00 MILIGRAMOS

ACCION Y MECANISMO

Hormona sexual con actividad androgénica, que controla el desarrollo y funcionalismo de los órganos y los caracteres sexuales secundarios masculinos. También produce efectos anabolizantes, que conducen a un incremento de la retención de agua y de la síntesis de proteínas, así como al desarrollo óseo. Actúa sobre receptores intracelulares específicos (similares a los de otras hormonas sexuales), induciendo la producción de ciertas proteínas a través de la síntesis de ARNm a partir de ADN.

FARMACOCINETICA

Vía (IM): Se administra vía im en forma de ésteres oleosos (cipionato, propionato y enantato). Los tres ésteres se absorben muy lentamente. El propionato permite una administración diaria, el cipionato cada 2-4 semanas y el enantato cada 3-6 semanas, ello hace que la duración de acción en forma decreciente sea: enantato, cipionato, propionato. Los ésteres son hidrolizados antes de que la testosterona ejerza su acción.

El grado de unión a proteínas plasmáticas es muy elevado (99%). Es metabolizado en el hígado. Es excretada en un 90% con la orina en forma de metabolitos conjugados, el resto se excreta con las heces debido a que sufre circulación enterohepática. El tiempo de vida media para la testosterona cipionato (im) es de 8 días.

INDICACIONES

Autorizadas en España: Tratamiento de déficit de andrógenos: hipogonadismo masculino, criptorquismo, orquitis, torsión bilateral, orquidectomía, impotencia, climaterio masculino. Infertilidad masculina por oligospermia. Supresión de la lactancia. Anemia aplásica. Insuficiencia renal aguda (para disminuir el catabolismo proteico). Coadyuvante en el carcinoma de mama. Cirrosis hepática. Osteoporosis. Carcinoma genital femenino.

POSOLOGIA

- Hipogonadismo (adultos, im): inicialmente 25 mg (testosterona propionato)/2-3 días; mantenimiento 100-250 mg (testosterona cipionato)/2-4 semanas, o bien, inicialmente 250 mg (testosterona enantato)/2-3 semanas, mantenimiento, 250 mg/3-6 semanas.

En alteraciones de la potencia sexual, inicialmente 100 mg (testosterona enantato)/semana durante 2 semanas, seguido de 100 mg/2-4 semanas y posteriormente 50 mg/2-4 semanas.

En climaterio masculino, 50-100 mg (testoterona enantato) /2-3 semanas, durante 6-8 semanas, con periodos de descanso de 4 semanas entre cada ciclo.

- Infertilidad por oligospermia: 100 mg (testosterona enantato)/2 semanas, generalmente asociado al comienzo del tratamiento con gonadotrofina sérica con actividad FSH (2 x 2000 ui/semana hasta la dosis total de 12.000 ui). El tratamiento debe prolongarse durante 90 días (ciclo completo de espermatogénesis) y eventualmente repetirse después de un intervalo de varias semanas.

- Anemia aplásica: 250 mg (testosterona enantato)/2-3 semanas durante varios meses.

- Coadyuvante en el carcinoma de mama: 250 mg (testosterona

enantato)/2 semanas, o bien, 100 mg (testosterona cipionato)/3 semanas o 250 mg (testosterona cipionato)/3 semanas. Si se manifestara hipercalcemia, hay que interrumpir el tratamiento.

- Insuficiencia renal aguda: 25 mg (testosterona propionato)/24 h, durante 10 días máximo.
- Supresión de la lactancia: 100 mg (testosterona cipionato) en el postparto.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Contraindicado en pacientes sensibles a los andrógenos o esteroides anabolizantes, carcinoma de mama en varones, carcinoma de próstata (agravamiento), hipercalcemia, insuficiencia hepática grave (aumenta la vida media de eliminación y los efectos secundarios), insuficiencia renal grave (edema con o sin insuficiencia cardíaca). Deberán guardarse especiales precauciones y vigilar estrechamente al paciente en: insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia coronaria, antecedentes de infarto de miocardio (efecto hipercolesterolemizante), hipertensión, edema, epilepsia, migraña, hipertrofia prostática benigna con obstrucción uretral (aumento de tamaño).

- Mujeres: tratamientos de androgenoterapia general (riesgo de virilización).
- Enfermos afectados por diabetes (riesgo de hiperglucemia), se recomienda el control de la glucosa sobre todo al principio del tratamiento.

INTERACCIONES/INTERFERENCIAS ANALITICAS

- Anticoagulantes orales: posible aumento del efecto anticoagulante. En pacientes con tratamiento con anticoagulantes orales, es preciso realizar una estrecha monitorización, sobre todo en el momento de comenzar el tratamiento con andrógenos o en el de interrumpirlo.
- Antidiabéticos: los efectos metabólicos de los andrógenos pueden disminuir la concentración de glucosa en sangre y, por consiguiente, reducir las necesidades de insulina.
- Ciclosporina: hay estudios con metiltestosterona en los que se ha registrado

aumento de las concentraciones plasmáticas de ciclosporina, por lo que puede aumentar el riesgo de nefrotoxicidad. Otros andrógenos pueden producir el mismo efecto.

- Oxifenbutazona: la administración simultánea de oxifenbutazona y andrógenos puede dar lugar a concentraciones séricas de oxifenbutazona elevadas.

EFFECTOS ADVERSOS

Las reacciones adversas son más frecuentes con dosis altas y en tratamientos prolongados. Las reacciones adversas más características son:

-Ocasionalmente (1-9%): edema, náuseas, vómitos, diarrea, excitación, insomnio, depresión, abuso;

en adolescentes: incremento de la frecuencia de erecciones, ginecomastia (en tratamientos de hipogonadismo).

-Raramente (<1%): cierre prematuro de las epífisis y detención del crecimiento en adolescentes; movimientos involuntarios, hipercolesterolemia, hipercalcemia, leucopenia, ictericia, hepatitis colestática; priapismo e incremento de la libido, principalmente en ancianos.

ADVERTENCIAS ESPECIALES

Los andrógenos pueden acelerar el crecimiento de las neoplasias malignas de la próstata.

COMPOSICION

"100 mg": Testosterona propionato, 25 mg. Testosterona enantato, 110 mg.

"250 mg": Testosterona enantato, 250 mg.

EMBARAZO

<http://www.factorestetica.com>

Categoría X de la FDA. Los andrógenos causan virilización de los genitales externos del feto femenino (p.e. clitoromegalia, desarrollo vaginal anormal y fusión de las formas genitales para formar una estructura similar a la escrotal). El grado de masculinización está relacionado con la cantidad de fármaco y la edad del feto y es más probable cuando se administran durante el primer trimestre. En este caso, el riesgo potencial embriotóxico y/o teratógeno supera claramente el teórico beneficio terapéutico, por lo que los andrógenos están contraindicados en mujeres que están o pretenden estar embarazadas. Por ello, se recomienda a las pacientes en edad fértil que adopten medidas anticonceptivas eficaces durante todo el tratamiento y, eventualmente, algún tiempo adicional después del mismo.

MADRES LACTANTES

Se ignora si este medicamento es excretado en cantidades significativas con la leche materna, y si ello pudiese afectar al niño. Se recomienda suspender la lactancia materna o evitar la administración de este medicamento.

USO EN NIÑOS

Deberá realizarse una estrecha vigilancia y un ajuste posológico adecuado ya que la administración a niños y prepúberes puede producir cierre prematuro de la epífisis (varones y hembras), pubertad precoz (varones) y virilización (hembras). Uso precautorio.

USO EN ANCIANOS

A partir de los 45 años el riesgo de hipertrofia prostática y carcinoma prostático puede estar aumentado, por lo que se aconseja realizar exploración de la próstata con medida de la concentración sérica de antígeno prostático específico antes de iniciar el tratamiento. Durante el tratamiento deben realizarse controles periódicos de la función prostática.

DOPAJE

Sustancia prohibida en el deporte de competición, susceptible de producir un resultado positivo en un control de dopaje.

TRIACANA: La descripción Triacana es un precursor de la hormona tiroidea L - el triiodthyromine (LT - 3) que es la hormona más fuerte que se produce en la glándula tiroidea. Ambas hormonas LT - 3 y LT -4 se producen en la glándula tiroidea y colectivamente regulan el metabolismo de los cuerpos . Triacana se ha administrado por médicos para el tratamiento de desórdenes tiroideos y obesidad y ha demostrado su efectividad en la comunidad médica. En la comunidad del culturismo Triacana se usa ampliamente para sus características . Triacana ayudará eficazmente a un atleta al aumentar el metabolismo del cuerpo significativamente. Muy a menudo, triacana se usa con otros esteroides y / u otras drogas como clenbuterol o ephedrine. Una dosificación común de triacana varía, dependiendo de las metas de los atletas. Triacana es mucho más seguro que hormonas como Cytomel y Thybon, por consiguiente el trastorno tiroideo es un efecto secundario muy raro. Es inteligente empezar con dosificaciones alrededor de 2-3 pastillas de .35mg / día y subiendo la dosis a 10-14 pastillas / día, . Entonces al final del ciclo, se va bajando la dosis. Un ciclo de triacana nunca debe ser más largo que 12 semanas para prevenir cualquier amenaza de la tiroides . Otros efectos secundarios asociados con el triacana son temblores, el vértigo, el nerviosismo, la inquietud, el latido del corazón irregular, la náusea, sudor excesivo, la diarrea, y también es posible experimentar otras complicaciones debido a la pérdida de peso rápida resultado de su uso. Triacana es un producto ilegal aunque su sustancia baja (el tiratracol) es legal en el EE.UU.. Cuando se encuentra en el mercado negro, triacana normalmente cuesta alrededor de \$80 - \$110.

[Volver](#)

W

WINSTROL: Winstrol es la marca del stanazolol . Stanazolol es un 17 - diseñado para la administración oral pero también disponible en la forma inyectable. Winstrol esta clasificado como un anabolico, y exhibe efectos androgénicos bajos. Las ganancias no son dramáticas y se usan a menudo en la combinación con otras drogas, la mayoría normalmente ciclos para secarse . En EE.UU., la marca que fábrica Zambon en España parece ser la más popular. Se proporciona en pastillas de 2mg y en ampollas de 50mg en base de agua . Las dosificaciones comunes son 10-25mg / día oralmente y 25-50 mg inyectables. En el mercado negro, se venden los ampules normalmente cuestan \$15-20. Obviamente Winstrol tiene un uso caro. Hay muchas formas de Winstrol falso, por lo que uno debe tener al comprar este producto. Las pastillas de Zambon son rosas y vienen 20 en una tira.

[Volver](#)